+ Lu et donné à l'académie par Monsieur Colon Chirurgien gagnant maitrise à l'hopital de Bicêtre.

Observation sur une hernie faite par le petit Epiploon dans la Région Epigastrique et qui se prolongeoit dans une ouverture à l'esthomac entre les deux orifices postérieurement. ~~lue à l'académie par Monsieur~~

Il arrive des hernies dans toute l'étendue du bas ventre qui peuvent être faites par les intestins, l'Epiploon, l'esthomac, la vessie &c. Mais il en arrive aussi qui sont faites de même par l'esthomac non seulement dans les régions du bas ventre, mais encore dans la poitrine en écartant les fibres charnües du diaphragme.

Je ne scache aucun autheur qui ayent rapporté que l'esthomac se soit percé pour permettre l'entrée d'une portion de l'Epiploon au dedans de ce viscère, pendant que l'autre se soit porté au dehors et ait formé à la surface extérieure du ventre une tumeur grosse comme un oeuf, comme le rapporte Monsieur Colon dans son observation.

Cet autheur dit que le nommé Claude Le Maire agé de 65 ans étoit attaqué depuis longtems d'une jaunisse universelle, excepté le blanc des yeux; je ne peut concevoir pourquoy cette partie n'a pas été jaune comme le reste de l'habitude du corps, puisque dans toutes les jaunisses ce sont toujours les yeux qui commencent à être jaune les premiers et cessent de l'être les derniers. Il faut que l'autheur ait eu la même surprise que moy puisqu'il en fait mention dans son mémoire quoique cela ne paroissent pas avoir rapport à la hernie.

Par rapport aux douleurs que le malade ressentoit depuis longtems à la région Epigastrique elles sont assez faciles à concevoir.

L'esthomac étant tiraillé continuellement par

Académie Nationale de Médecine

ARC 16 d2 n°48

vne portion de l'Epiploon qui etoit introduite
dans Son ouverture qui réjondoit à L'extérieur,
en passant par les muscles du bas ventre; étoit
vraisemblablement La Cause des Souffrances
Continuelles du Malade, joint aux Mouvements
D'inspiration, et D'expiration qui ne pouvoient
Se faire Sans occasionner ce tiraillement Et
causer ces douleurs.

La question est de Sçavoir Comment L'ouverture
qui S'est trouvée à L'esthomac, et que l'autheur
appelle crevasse S'est formée: et Comment il
à été possible qu'une portion du petit Epiploon
S'y Soit introduite.

Je Serois assez porté à Croire qu'il y à eu vne
inflammation à L'esthomac Suivie d'un
dépôt, et que L'épiploon S'est colé à La portion
enflammée de Ce viscère, qui à bouché L'ouverture
après que L'exfoliation en à été faite, et Même
S'est prolongé dans L'esthomac et y à augmenté
de volume.

Nous avons des Exemples que L'Epiploon
augmente de volume, et quoique comprimé ne
Suppure pas, et ne tombe pas en Exfoliation
aisément, Sur tout quand il est renfermé dans
Le Ventre; puisque j'ay fait plusieurs fois La
Ligature d'une portion de L'épiploon comme Les
autheurs Le Conseilloient dans L'opération des
hernies; Espérant que La Chute S'en feroit
avec La Ligature, Mais jamais cette Chute ne
S'est faite parfaitement, et quand j'ay voulu
tiré Le fil j'ay toujour déchiré La portion
Comprise dans La Ligature, Sans que La Chute
S'en Soit faite audessus comme il arrive dans
Les vaisseaux des autres parties, et quoique
j'aye attendu beaucoup de temps pour La faire:
Ce qui M'a fait prendre Le party d'abandonner

La ligature de l'Epiploon dans tous les cas ou les autheurs la conseilloient. Mais quand je le trouve livide, et prêt à s'esfolier, je me contente de le renverser sur les bords extérieurs de la playe, ne craignant aucune hémorragie des vaisseaux de ce viscère.

Quoique l'académie soit surchargée des mémoires que l'on à donné sur tant de différentes espèces de hernies; celuy cy je crois mérite d'être admis au nombre de ceux dont elle fera mention, étant un fait rare et extraordinaire, qui suffit bien pour engager l'autheur de ne pas manquer dans tous les cas, de faire part à l'académie des découvertes qu'il pourra faire.

Mertrud

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

No 30